


Bioindication Lichénique

Année 2016

	état des lieux				Phase de suivi			
	été 2003				novembre-16			
	PCDD/PCDF	Métaux lourds			PCDD/PCDF	Métaux lourds		
		Pb	Cd	Hg	OMS 2005	Pb	Cd	Hg
	en ng I-TEQ/kg	en mg/kg			en ng I-TEQ/kg	en mg/kg		
Grangeardière	2,1	7,8	0,2	0,2	1,8	12,4	0,82	<lq
Manet	7	21	0,2	0,2				
Briantaisière	2,2	14	1	0,1	2,5	6,2	0,14	0,07
Auverse	1,5	5,7	0,1	0,1				
Bois Martin	2,1	19	0,3	0,2	2,8	3	0,13	0,13
Lasse	1,6	2,2	<0,1	0,1				
Brégellerie	1,6	1,1	<0,1	<0,1	2,1	1,2	0,14	0,05
Picotière	2,1	17	0,2	0,2				
Breil de Foin	2,1	5,7	0,1	0,1				

Objectif	Pas de restriction à l'usage agricole	restriction à l'usage agricole
Dioxines et Furanes		
<20 ng I-TEQ/Kg	compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg	>160 ng I-TEQ/kg

CONCLUSION d'Air lichens

Dioxines

"De 2015 à 2016, les données sont stables dans la mesure où il ne s'agit que de teneurs de fond."

Métaux lourds

"La charge métallique totale est faible et ne présente pas de variation importante de 2015 à 2016."

Bioindication Lichénique
Année 2016