


Historique Bio Indication Lichénique Année 2017

|  | état des lieux | | | | Phase de suivi | | | |
|---|----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|------|------|
| | été 2003 | | | | décembre-17 | | | |
| | PCDD/PCDF | Métaux lourds | | | PCDD/PCDF | Métaux lourds | | |
| | en ng I-TEQ/kg | Pb | Cd | Hg | OMS 2005 | Pb | Cd | Hg |
| | en mg/kg | | | en ng I-TEQ/kg | en mg/kg | | | |
| Grangeardière | 2,1 | 7,8 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 2,4 | 0,1 | <lq |
| Manet | 7 | 21 | 0,2 | 0,2 | | | | |
| Briantaisière | 2,2 | 14 | 1 | 0,1 | 2 | 8,7 | 0,23 | 0,09 |
| Auverse | 1,5 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | | | | |
| Bois Martin | 2,1 | 19 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | 2,6 | 0,1 | 0,1 |
| Lasse | 1,6 | 2,2 | <0,1 | 0,1 | | | | |
| Brégellerie | 1,6 | 1,1 | <0,1 | <0,1 | 2,1 | 0,9 | 0,14 | 0,07 |
| Picotière | 2,1 | 17 | 0,2 | 0,2 | | | | |
| Breil de Foin | 2,1 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | | | | |

| Objectif | Pas de restriction à l'usage agricole | restriction à l'usage agricole |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dioxines et Furanés | | |
| <20 ng I-TEQ/Kg | compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg | >160 ng I-TEQ/kg |

CONCLUSION d'Air lichens

"Aucune traçabilité environnementale de dioxines et furanes liées aux émissions de l'UVE n'est retrouvée."

"La campagne de surveillance des retombées métalliques autour de l'UVE du SIVERT de l'Est Anjou montre qu'aucune retombée importante n'est décelable par les dosages dans les lichens"