


| Bioindication Lichénique Année 2021 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|------|------|-------------------------------|---------------|------|------|
|  | état des lieux été 2003 | | | | Phase de suivi décembre-21 | | | |
| | PCDD/PCDF | Métaux lourds | | | PCDD/PCDF | Métaux lourds | | |
| | | Pb | Cd | Hg | OMS 2006 | Pb | Cd | Hg |
| | en ng I-TEQ/kg | en mg/kg | | | en ng I-TEQ/kg | en mg/kg | | |
| Grangeardière | 2,1 | 7,8 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 0,05 | 0,1 |
| Manet | 7 | 21 | 0,2 | 0,2 | | | | |
| Briantaisière | 2,2 | 14 | 1 | 0,1 | 2,3 | 2,1 | 0,14 | 0,14 |
| Auverse | 1,5 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | | | | |
| Bois Martin | 2,1 | 19 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 2 | 0,09 | 0,1 |
| Lasse | 1,6 | 2,2 | <0,1 | 0,1 | | | | |
| Brégellerie | 1,6 | 1,1 | <0,1 | <0,1 | 1,8 | 1 | 0,19 | 0,1 |
| Picotière | 2,1 | 17 | 0,2 | 0,2 | | | | |
| Breil de Foin | 2,1 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | | | | |

| Objectif | Pas de restriction à l'usage agricole | restriction à l'usage agricole |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dioxines et Furanes | | |
| <20 ng I-TEQ/Kg | compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg | >160 ng I-TEQ/kg |

CONCLUSION d'Air lichens

"En 2021, aucune significativité n'est signalée et celle de L2-Bois Martin en 2020 n'est pas reconduite.

La valeur la plus « élevée » de ces bruits de fond est située sur L4-Briantaisière avec 2,3 ng/kg TEQ OMS 1998 soit 11,5% du seuil d'alerte ce qui ne demande bien entendu pas de recommandation. "