

Bioindication Lichénique Année 2022								
	état des lieux été 2003				Phase de suivi décembre-22			
	PCDD/PCDF	Métaux lourds			PCDD/PCDF	Métaux lourds		
		Pb	Cd	Hg	OMS 2006	Pb	Cd	Hg
	en ng I-TEQ/kg	en mg/kg			en ng I-TEQ/kg	en mg/kg		
Grangeardière	2,1	7,8	0,2	0,2	1,6	2	0,2	0,1
Manet	7	21	0,2	0,2				
Briantaisière	2,2	14	1	0,1	1,4	2,1	0,15	0,1
Auverse	1,5	5,7	0,1	0,1				
Bois Martin	2,1	19	0,3	0,2	2,3	2	0,09	0,09
Lasse	1,6	2,2	<0,1	0,1				
Brégellerie	1,6	1,1	<0,1	<0,1	1,2	0,8	0,14	0,09
Picotière	2,1	17	0,2	0,2				
Breil de Foin	2,1	5,7	0,1	0,1				

Objectif	Pas de restriction à l'usage agricole	restriction à l'usage agricole
Dioxines et Furanes		
<20 ng I-TEQ/Kg	compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg	>160 ng I-TEQ/kg

CONCLUSION d'Air lichens

PCDD/F

L'analyse logarithmique des congénères montre des courbes qui témoignent de sources diverses comme c'est souvent le cas lors de bruits de fond généralisés.

ETM (métaux)

La charge métallique est particulièrement faible pour chacun des emplacements. Aucun ETM ne présente de significativités.

