


Bioindication Lichénique Année 2025								
	état des lieux été 2003				Phase de suivi décembre-25			
	PCDD/PCDF	Métaux lourds			PCDD/PCDF	Métaux lourds		
		Pb	Cd	Hg	OMS 2005	Pb	Cd	Hg
	en ng I-TEQ/kg	en mg/kg			en ng I-TEQ/kg	en mg/kg		
Grangeardière	2,1	7,8	0,2	0,2	1,5	2,5	0,14	0,14
Manet	7	21	0,2	0,2				
Briantaisière	2,2	14	1	0,1	1,5	1,4	0,14	0,09
Auverse	1,5	5,7	0,1	0,1				
Bois Martin	2,1	19	0,3	0,2	2,5	2,2	0,1	0,1
Lasse	1,6	2,2	<0,1	0,1				
Brégellerie	1,6	1,1	<0,1	<0,1	1,2	0,8	0,19	0,05
Picotière	2,1	17	0,2	0,2				
Breil de Foin	2,1	5,7	0,1	0,1				

Objectif	Pas de restriction à l'usage agricole	restriction à l'usage agricole
Dioxines et Furanes		
<20 ng I-TEQ/Kg	compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg	>160 ng I-TEQ/kg

CONCLUSION d'Aair lichens

PCDD/PCDF

Le moyen terme, 2021-2025, est stable avec des teneurs de base généralisées.

Le long terme (2015-2025) affirme une décroissance dans des valeurs faibles.

L'analyse des congénères est typique de bruits de fond.

Métaux lourds

La charge métallique (Cd, Hg et Pb) est systématiquement faible.

Aucune significativité n'est repérée au moyen terme (2021-2025).